

SHISEIDO


販売名 モアリップ 8g

第3類医薬品

発売元：資生堂薬品株式会社
東京都中央区銀座7-5-5
お客さま窓口 03-3573-6673
受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日を除く)
製造販売元：株式会社 資生堂
東京都中央区銀座7-5-5
MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

モアリップの5つの成分が、口びるアレに効く。



△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 湿潤やただれのひどい人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 使用后、皮ふに発疹・発赤、かゆみがあらわれた場合
(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【適応症】 口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 口唇への外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 (1g中) アラントイン5mg / グリチルレチン酸3mg / トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 2mg / ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 1mg / パンテノール5mg 添加物として流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、パラベン、トメントール、ワセリンを含有します。

【保管及び取扱上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わります。) *冬季など気温の低い時に中味が硬くなり、チューブから出にくくなることがあります。手の中で温めてからご使用ください。*ご使用後は、チューブの口元をきれいにふいてください。